

۱- در صورت عدم امکان برای درمان قطعی دندانی که دچار شکستگی Enamel Dentin fracture شده است

کدام اقدام باید هرچه زودتر انجام شود؟

أ. پوشش عاج اکسپوز شده

ب. چسباندن قطعه شکسته شده

ج. اسپلینت دندان

د. روت کانال تراپی

۲- منظور از Complicated Crown fracture چیست؟

أ) شکستگی تاج دندان به همراه شکستگی جداگانه ریشه

ب) شکستگی تاج که تا ریشه ادامه داشته باشد

ج) شکستگی تاج که به همراه اکسپوژر پالپ است

د) خردشدگی متعدد چند دندان

۳- منظور از Reattachment of Crown fragment چیست؟

أ) جایگزین مجدد دندانی که کاملاً از ساکت خارج شده

ب) چسباندن قطعه شکسته شده تاج به قسمت باقیمانده در ساکت

ج) اسپلینت دندان های آسیب دیده به هم

د) جابجا کردن یک دندان سالم در بیمار به جای دندان از دست رفته

۴- منظور از Partial Pulpotomy چیست؟

أ) برداشتن قسمتی از پالپ تاجی که دچار آسیب شده

ب) برداشتن قسمتی از پالپ ریشه به همراه پالت تاجی

ج) پوشش ناکامل پالپ اکسپوز شده

د) پوشش پالپ اکسپوز شده با ترکیب چند ماده

۵- دندان سانترال ماگز یلای فرد ۱۸ ساله ای سه هفته قبل دچار شکستگی تاج و اکسپوژر پالپ شده است کدام یک

از درمان های ذیل را انتخاب می کنید؟

أ) Partial Pulpotomy

ب) Indirect Pulp Capping (IPC)

ج) Direct Pulp Capping (DPC)

د) Root Canal Therapy (RCT)

۶- مدت زمان اسپلینت برای درمان دندانی Avulsed شده که در شرایط با پروگنوز خوب و مساعد درمان شده

چند روز است؟

(أ) ۲-۳ هفته

(ب) ۳-۴ هفته

(ج) ۷-۱۰ روز

(د) ۶ هفته

۷- در کدام یک از آسیب های جابجایی ذیل، شکستگی استخوان آلوئول معمولاً وجود دارد؟

(أ) Intrusive LUX.

(ب) Extrusive LUX.

(ج) Lateral LUX.

(د) Subluxation

۸- دندان سانترال شیری کودک ۵ ساله ای دچار خارج شدن قسمتی (extrusive lux) شده است کدام درمان را

انتخاب می کنید؟

(أ) کشیدن دندان

(ب) جایگزینی و اسپلینت

(ج) کنترل برای چند هفته و بدون درمان

(د) اجازه برای رویش خود به خودی

۹- کدامیک از گزینه های زیر جز موارد کنتر اندیکاسیونهای روکشهای استیل نمی باشد؟

(أ) درمان قطعی در دندان دائمی

(ب) ناتوانی در تطابق روکش به علت عدم همکاری

(ج) آلرژی به نیکل

(د) دندان شیری که بیش از ۱/۳ ریشه ی آن تحلیل رفته

۱۰- تطابق نهایی روکش شامل همه موارد زیر میشود به جز؟

(أ) نیروهای متوسط اکلوزالی روی مارژین نباید باعث جابجایی روکش شود

(ب) لبه لته ای روکش ۱ میلی متر به زیر کرسست لته گسترش یافته باشد

(ج) در مارژین سرویکالی هیچ فاصله ای بین دندان و روکش نباشد

(د) نشست روکش با سفید شدن لته همراه باشد

۱۱- پلایر جانسون شماره ۱۱۴-۸۰۰ به چه منظوری در آماده سازی روکشهای استیل به کار می رود؟

- ا) کانتورینگ
- ب) کریمپینگ
- ج) کانتورینگ و کریمپینگ
- د) این پلایر در آماده سازی روکشهای استیل کاربردی ندارد

۱۲- تراش ناکافی سطح اکلوزال منجر به همه موارد زیر میشود به جز؟

- ا) فشرده شدن بیش از حد لته
- ب) اپن بایت
- ج) کانتکت اکلوزالی بالا
- د) سوراخ شدن بعدی روکش

۱۳- همه موارد زیر از اندیکاسیونهای روکشهای استیل می باشد به جز؟

- ا) کودکان در ریسک بالای پوسیدگی دندان های قدامی و یا خلفی
- ب) براکسیزم شدید
- ج) آملوژنزیس ایمپرکتا
- د) پوسیدگی های دیستال دندان مولر اول شیری

۱۴- همه موارد زیر از مزایای روکشهای استیل می باشد به جز؟

- ا) جایگذاری سریع
- ب) دوام بالا
- ج) حساسیت تکنیکی بالا
- د) حفظ فضا و طول قوس دندان

۱۵- کانتورینگ روکش استیل با کدامیک از پلایرهای زیر امکان پذیر نیست؟

- ا) bird beak
- ب) Gordon
- ج) Hoe
- د) Ball & socket

۱۶- از بین فاکتورهای مختلف حین سمان کردن روکش استیل مهمترین فاکتور چه می باشد؟

- ا) وضعیت پالپ دندان
- ب) نوع سمان استفاده شده
- ج) ایزوله نمودن محیط عمل
- د) نحوه آماده سازی سمان استفاده شده

۱۷- کودکی مبتلا به تب روماتیسمی که به مدت طولانی آموکسی سیلین دریافت میکند جهت انجام کشیدن دندان

مراجعه نموده است، چه رژیم پروبیلاکسی را توصیه میکنید؟

- ا) آموکسی سیلین ، 50mg/kg خوراکی یک ساعت قبل از عمل
- ب) آزیترومایسین ، 15mg/kg خوراکی یک ساعت قبل از عمل
- ج) قطع آموکسیسیلین و استفاده از آزیترومایسین
- د) آموکسی سیلین دریافتی کافی است

۱۸- کدامیک از موارد زیر هیپرترمی (Hyperthermia) کمتری ایجاد میکند؟

- ا) rainbow stabilizing system
- ب) Triangular sheet
- ج) Papoose board
- د) Beanbag dental chair

۱۹- در درمان دندانپزشکی کودکان مبتلا به سندروم داون توجه به احتمال ابتلا آنها به کدامیک از بیماریهای زیر

برای دندانپزشک باید اهمیت بیشتری داشته باشد؟

- ا) بیماریهای پریدنتال
- ب) عفونت های تنفسی
- ج) تالاسمی
- د) نقایص قلبی

۲۰- کدامیک از موارد زیر در برنامه ریزی برای درمان دندانپزشکی کودکان ناتوان توصیه می گردد؟

- ا) دادن جایزه قبل از شروع هر درمان
- ب) انجام کار بیشتر در هر جلسه جهت کاهش تعداد جلسات
- ج) سریع صحبت کردن و دستورات تک کلمه ای جهت جلوگیری از خستگی
- د) برنامه ریزی برای انجام درمانها در ابتدای روز

۲۱- در کدام دسته از بیماران قلبی زیر پروفیلاکسی جهت اندوکاردیت در هنگام درمانهای دندانپزشکی توصیه نمی شود؟

- ا) سابقه bypass عروق کرونر
- ب) بیماری مادرزادی قلبی
- ج) در بیماران با دریچه هموگرافت طی ۶ ماه بعد از عمل
- د) اختلال عملکرد اکتسابی دریچه ای

۲۲- پسریچه ۱۰ ساله مبتلا به سندرم الکل جنینی مراجعه نموده است. احتمال کدام مورد زیر در وی کم است؟

- ا) مادر طی ۲ ماه ابتدایی بارداری الکل مصرف نموده است.
- ب) تمایل به هایپراکتیو بودن دارد
- ج) ابنورمالیتی های نورولوژیک دارد
- د) بیشتر مشکلات دندانی وی مربوط به مال اکلوژن می باش

۲۳- کدامیک از موارد زیر در بیماران CHD (congenital heart disease) قابل انجام نمیباشد؟

- ا) درمان ریشه دندانهای دایمی
- ب) بیهوشی عمومی
- ج) درمان پالپ دندان شیری با سابقه آبسه
- د) استفاده از نیتروزاکساید

۲۴- کدامیک از داروهای زیر در کودکان مبتلا به آسم که از برونکودیلاتور استفاده می کنند می توان تجویز کرد؟

- ا) باربیتوراتها
- ب) استامینوفن
- ج) ترکیبات اسپرین
- د) نارکوتیک ها