

۱- تمام موارد زیر جزو اشکال بالینی شایع ضایعات پیش سرطانی حفره دهان است بجز؟

الف- تاول

ب- پلاک سفید

ج- پلاک قرمز

د- زخم

۲- شایعترین محل ضایعات پیش سرطانی حفره دهان کدام است؟

الف- کام سخت

ب- لته

ج- زبان

د- مخاط باکال

۳- تمام موارد زیر از علایم بالینی اریتروپلاکیا میباشد بجز؟

الف- حدود مشخص

ب- سوزش و درد

ج- اغلب سایز کوچک (زیر ۲ سانتی متر)

د- اغلب در مردان مسن

۴- تمام موارد زیر جزو فاکتورهای پرخطر برای لکوپلاکیا محسوب میشوند بجز؟

الف- مزمن بودن

ب- نمای بالینی

ج- محل درگیری

د- درد

۵- بهترین نمای تشخیص بالینی لیکن پلان دهانی وجود کدامیک از موارد زیر است؟

الف- نواحی قرمز

ب- خطوط سفید اشعه وار

ج- لنفادنوپاتی

د- سوزش

۶- تمام موارد زیر از اندیکاسیون های تلوئیدن بلو است بجز؟

الف- بررسی ضایعات مشکوک به بدخیمی

ب- رفع نگرانی بیمار

ج- تعیین محل بیوپسی

د- افتراق ضایعات آماسی از سرطانی

۷- تمام موارد زیر تعیین کننده پروگنوز کنسر میباشد بجز؟

الف- جنسیت

ب- نمای پاتولوژی

ج- مقاومت میزبان

د- نوع کنسر

۸- تمام موارد زیر از علل تاخیر در تشخیص سرطان دهان است بجز؟

الف- بدون درد بودن اغلب کنسرها

ب- بهداشت ضعیف بیمار

ج- عدم آگاهی بیمار

د- عدم شک و دقت دندانپزشک

۹- کدام گزاره جامع ترین تعریف سرطان می باشد؟

ا) پیدایش و تکثیر سلولهای غیرطبیعی

ب) دیده شدن میتوزهای غیرعادی در تکثیر سلولها

ج) تکثیر بدون اجازه سلولهای بافت

د) رشد و تکثیر سلولهای بافتی

۱۰- اولین علامتی که در برخورد با زخمهای مشکوک به سرطان، بررسی می کنید کدام است؟

ا) وجود بدشکلی و نکروز در زخم

ب) وجود غدد لنفاوی غیرطبیعی در محل

ج) وجود سفتی (enduration) در لبه های زخم

د) وجود متاستاز خصوصاً در ریه ها

۱۱- در سرطانهای مخاط (و سایر بافتهای پوششی نظیر پوست)، اصلی ترین مشخصه تعیین کننده در تاخیر و یا به

موقع بودن تشخیص شما کدام است؟

ا) وجود متاستاز در بافتهای دیگر

ب) عبور سلولها از لایه بازال

ج) درگیری غدد لنفاوی منطقه

د) دیده شدن میتوزهای غیرعادی در بیوپسی

۱۲- شایعترین سرطان غدد بزاقی، که تقریباً دو سوم سرطانهای غدد بزاقی را شامل می شود کدام است؟

ا) پلیومورفیک آدنوما

ب) موکوپای درموئید کارسینوما

ج) تومور وارتین

د) آدنوئید سیستیک کارسینوما

۱۳- پدیده خوش خیمی که می تواند خود را شبیه سرطان بدخیم غدد بزاقی فرعی نشان دهد کدام است؟

(أ) موکوسل

(ب) کیست های احتباسی غدد سباسه مخاط

(ج) نکروتایزینگ سیالومتاپلازی

(د) لیکن وزیکولار

۱۴- شایع ترین سرطان بدخیم غدد بزاقی کدام است؟

(أ) تومور وارتین

(ب) پلئومورفیک آدنوما

(ج) آدنوئید سیستیک کارسینوما

(د) اپی درموئید کارسینوما

۱۵- این علامت کلینیکی در تمامی ضایعات پاتولوژیک غدد بزاقی اصلی، به عنوان پای ثابت؛ مشاهده می گردد:

(أ) وجود Tenderness در محل غدد بزاقی

(ب) بدشکلی و تغییر شکل سطحی در محل غدد بزاقی

(ج) وجود سفتی و یا افزایش حجم غدد بزاقی

(د) وجود اریتم (Erythema) در محل نوک مجرای خروجی غدد بزاقی

۱۶- در انتهای کام آقای ۵۵ ساله ای، ضایعه ای شبیه جوش سرسیاه از چند هفته پیش ایجاد شده است در لمس

اطراف ضایعه، سفتی غیر طبیعی ملاحظه می گردد. تشخیص احتمالی شما کدام است؟

(أ) موکوپای درموئید کارسینوما

(ب) سیالومتاپلازی

(ج) تومور وارتین

(د) موکوسل

۱۷- کدامیک از گزینه های ذیل از اندیکاسیونهای بیوپسی مخاط دهان نمی باشد؟

(أ) ضایعات التهابی که به درمنهای معمول طی ۱۰-۱۴ روز پاسخ ندهند

(ب) ضایعه ای که با فانکشن موضعی نرمال جویدن در دهان تداخل داشته باشد

(ج) ضایعات دارای کراتوز و خشونت افزایش یافته سطحی بدون تحریک موضعی

(د) ضایعات آناتومیکی و دوطرفه و برجسته داخل مخاط گونه

۱۸- کدامیک از شرایط زیر قبل از انجام بیوپسی کمتر نیازمند توجه است؟

(أ) Congenital heart defects

(ب) Coagulopathies

(ج) hypothyroidism

(د) Poorly controlled diabetics

۱۹- پرسش درباره کدام گزینه قبل از بیوپسی در تاریخچه بیمار اهمیتی ندارد؟

(أ) تب

(ب) بی اشتهایی

(ج) کاهش وزن

(د) بیخوابی

۲۰- بیماری با شکایت از ضایعه اگزوفیتیک بین دندانها در ناحیه قدام فک پایین مراجعه کرده است کدامیک از

گزینه های زیر در طرح درمان کارائی ندارد؟

(أ) جرم گیری و بروساژ اولیه

(ب) تهیه رادیوگرافی پری آپیکال

(ج) خارج کردن دندانهای قدامی

(د) رفع عامل موضعی تحریک

۲۱- بررسی میزان Ca,P,ALP در کدام بیماری الزامی نیست؟

(أ) Tumor of hyperparathyroidism

(ب) Pagets disease

(ج) Multiple myeloma

(د) Fibrous dysplasia

۲۲- در تشخیص ضایعات متموج کدام گزینه کارائی ندارد؟

(أ) اسپیراسیون

(ب) لمس

(ج) سی تی اسکن

(د) ام آر آی

۲۳- بیوپسی انسیرنال در کدام گزینه کارائی دارد؟

(أ) ضایعات نزدیک به نواحی خطرناک

(ب) ضایعات بزرگتر از ۱ سانتی متر

(ج) ضایعاتی که نمای کراتوتیک و رنگی دارند

(د) ضایعات کوچکتر از ۱ سانتی متر

۲۴- کدامیک از تجهیزات زیر در بیوپسی های بافت نرم کم کاربردتر است؟

(أ) فورسپس کاهورن

(ب) بیستوری با تیغه ۱۵

(ج) هموستات کوچک

(د) فرمالین ۱۰٪