

## ۱- کدامیک از موارد زیر ریسک فاکتور اصلی بیماری پریدونتال است؟

الف. استرس

ب. دیابت

ج. استئوپروزیس

د. BOP

## ۲- تأثیر جنس بر روی بیماری پریدونتال بعلت کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف. فاکتورهای ژنتیکی

ب. تفاوت در سطح استرس

ج. انجام اعمال پیشگیری کننده

د. تفاوت‌های هورمونی

## ۳- استعمال دخانیات چگونه موجب افزایش ریسک ابتلا به بیماریهای پریدونتال میشود؟

الف. ارتباط بین مصرف دخانیات و بیماریهای پریدونتال تحت تاثیر بهداشت دهانی افراد می باشد

ب. ارتباط کاملاً مستقیم بین مصرف دخانیات و شیوع بیماری پریدونتال وجود دارد

ج. سن شروع استعمال دخانیات فاکتوری مهم در افزایش ریسک بیماری پریدونتال می باشد

د. ارتباط بین مصرف دخانیات و بیماریهای پریدونتال تحت تاثیر سن افراد می باشد

## ۴- در رابطه با تأثیر سن بر شدت و شیوع بیماری پریدونتال کدام گزینه صحیح است؟

الف. سن ریسک فاکتور بیماری پریدونتال می باشد

ب. سن به تنهایی موجب افزایش استعداد بیماری پریدونتال نمی شود

ج. بیماری پریدونتال نتیجه اجتناب ناپذیر از روند افزایش سن می باشد

د. شدت بیماری های پریدونتال با افزایش سن، کاهش می یابد

## ۵- شرایط اقتصادی اجتماعی چگونه بر روی بیماریهای پریدونتال موثر است؟

الف. موقعیت اقتصادی اجتماعی ریسک فاکتور بیماری پریدونتال میباشد

ب. شرایط اقتصادی اجتماعی به هیچ عنوان نمی تواند تاثیری در شیوع بیماری پریدونتال داشته باشد

ج. شرایط اقتصادی اجتماعی پایین به تنهایی می تواند منجر به افزایش احتمال ابتلا به پریدونتیت شود

د. شرایط اقتصادی اجتماعی پایین بعد از تنظیم دیگر عوامل خطر ساز، به تنهایی نمی تواند منجر به افزایش

احتمال ابتلا به پریدونتیت شود

۶- کدامیک از آزمایش های زیر کنترل قند سه ماه اخیر بیمار را نشان می دهد.

الف. FBS

ب. HBA1C

ج. Random Blood Sugar

د. 2hppt

۷- در مورد استئوپروزیس کدام گزینه صحیح است.

الف. استئوپروزیس سیستمیک موجب تحلیل عمودی در استخوان آلوئولار می شود

ب. استئوپروزیس موجب کاهش مقاومت پرئودنشیوم در برابر شرایط التهابی می شود

ج. استئوپروزیس ریسک فاکتور بیماری پرئودنتال می باشد

د. استئوپروزیس کنتراندیکاسیون قطعی درمان ایمپلنت می باشد

۸- پلاک باکتریال چگونه موجب افزایش استعداد ابتلا به بیماری پرئودنتال میشود؟

الف. کمیت پلاک مهمترین فاکتور در ایجاد پرئودنتیت می باشد

ب. کیفیت بیوفیلم پلاک تعیین کننده شدت و نوع پرئودنتیت می باشد

ج. در ایجاد التهاب لته کیفیت پلاک مهمتر از کمیت آن می باشد

د. اورهنگ ترمیم با افزایش گیر پلاک به عنوان ریسک فاکتور پرئودنتیت مشخص شده است

۹- کدامیک از موارد زیر از اندیکاسیون های استفاده از carisolv می باشد؟

الف) پوسیدگی های پیت و فیشور با عمق کم

ب) در جلسه درمانی که نیاز به زمان کوتاه می باشد

ج) پوسیدگی های عمیق نزدیک پالپ

د) افراد دارای آلرژی

۱۰- کدامیک از موارد زیر از کنتراندیکاسیون های استفاده از air abrasion می باشد؟

الف) برداشت پوسیدگی های سطحی مینا

ب) آماده سطح abfraction

ج) برداشت stain سطحی پیت و فیشورها

د) برداشت پوسیدگی ساب ژنژیوال

۱۱- کدامیک از روش های آماده سازی حفره فقط بر عاج پوسیده تاثیر می گذارد؟

الف) carisolv

ب) air abrasion

ج) لیزر

د) اکسکویتور

۱۲- از کدامیک از لیزرهای زیر می توان برای آماده سازی حفره استفاده کرد؟

الف) diode

ب) CO<sub>2</sub>

ج) Er:YAG

د) ND:YAG

۱۳- کدامیک از روش های زیر علاوه بر آماده سازی حفره در پیشگیری از پوسیدگی هم موثر است؟

الف) carisolve

ب) لیزر

ج) air abrasion

د) ozona

۱۴- بر اساس تقسیم بندی رادیوگرافیک در کدامیک از موارد زیر از resin infiltration استفاده می شود؟

الف) ضایعات D2

ب) ضایعات D3

ج) ضایعات D1 در فرد high risk

د) ضایعات E2 در فرد high risk

۱۵- کدامیک از موارد زیر از ویژگی های ضایعات اکتیو در مینا می شود؟

الف) با بررسی توسط پروب سطح ضایعه rough می باشد

ب) ضایعه براق بوده و در بررسی با پروب سخت می باشد

ج) سطح ضایعه قهوه ای رنگ یا سیاه می باشد

د) در بررسی توسط پروب ضایعه نرم و چرمی می باشد

**۱۶- کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با ART صحیح می باشد؟**

- الف) تفاوتی در بقا رستوریشن ART چند سطحی با GI با ویسکوزیتی بالا و رستوریشن آمالگام در دندان های خلفی شیری وجود ندارد
- ب) ART سیلنت ها اثرات پیشگیری از پوسیدگی ضعیفی دارند
- ج) در تکنیک ART معمولا نیاز به استفاده از بی حسی موضعی می باشد
- د) رستوریشن ART یک سطحی با GI با ویسکوزیتی بالا در دندان های شیری و دائمی میزان بقا بالایی دارد

**۱۷- هدف از CRA کدام است؟**

- أ) درمان زودهنگام پوسیدگی ها
- ب) پیشگیری از پوسیدگی
- ج) برنامه ریزی آینده
- د) آموزش بیماران

**۱۸- High-Risk strategy به چه معنی است؟**

- أ) تمرکز پیشگیری روی افراد در معرض خطر بیماری
- ب) پیشگیری از یک بیماری در کل جامعه
- ج) حفظ سلامت همه مردم
- د) درمان زودهنگام بیماری

**۱۹- کدام گروه سنی بیش از همه در معرض خطر پوسیدگی است؟**

- أ) گروه سنی ۵-۷ سال
- ب) گروه سنی ۱۱-۱۴ سال
- ج) گروه سنی ۱-۲ سال
- د) گروه سنی ۲۰-۲۵ سال

**۲۰- کدامیک از عوامل زیر عامل خطر مهمتری برای شروع پوسیدگی است؟**

- أ) کاربرد دستگاه های ارتودنسی
- ب) مصرف دارو
- ج) نامرتب بودن دندان ها
- د) کاهش ترشح بزاق

۲۱- Carries Risk Profile کودک ۷ ساله ای ۱۰ است این کودک در کدام گروه خطر پوسیدگی قرار می گیرد؟

- ا) کم خطر
- ب) پرخطر
- ج) خطر متوسط
- د) بسیار پرخطر

۲۲- تست های آزمایشگاهی ارزیابی خطر پوسیدگی کدامند؟

- ا) میزان ترشح بزاق
- ب) میزان قندخون
- ج) شمارش لاکتوباسیل بزاق
- د) شمارش میکروارگانیزم های گرم منفی بزاق

۲۳- نخستین بار CRA در چه سالی مطرح شد؟

- ا) ۱۹۷۷
- ب) ۱۹۸۴
- ج) ۱۹۹۲
- د) ۱۹۹۴

۲۴- در مطالعه دکتر پورهاشمی در زمینه خطر بروز پوسیدگی در کودکان تهرانی چند درصد کودکان ۷ ساله High

Risk بودند؟

- ا) ۲۹/۲ درصد
- ب) ۵۵/۵ درصد
- ج) ۲۸/۹ درصد
- د) ۱۵/۶ درصد